



สรุปรายงานการประชุม

World Council of Enterostomal Therapists 22<sup>nd</sup>

Biennial Congress 2018

ณ. ประเทศมาเลเซีย.

ตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 18 เมษายน 2561

ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

พ.ศ. 2561



































รีดให้เรียบ ตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า 6.5 ซม. x 9.5 ซม. เจาะรูด้วยเหล็กเจาะรูเป็นแถวห่างกันประมาณ 0.5 ซม. แล้วนำไปแช่ด้วยน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นประมาณ 2-3 วัน เพื่อให้ไขมันมะพร้าวซึมซับเข้าไปในใบตอง เต็มที่จากนั้นให้สะเด็ดน้ำมัน แล้วบรรจุลงในถุงซิปลอนขนาด ซิปปิดปากให้สนิทห่อด้วยผ้าห่อเช็ท ส่องอบไอน้ำแรงดันสูงให้ปลอดเชื้อก่อนนำไปใช้ โดยเก็บข้อมูลผู้ป่วยแผลลอกจากอุบัติเหตุจากรถ และแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวก จำนวน 9 คนโดยใช้ 1-3 วันพบว่าไม่พบปัญหาผ้าก๊อชติดแผลร้อยละ 100 ผู้รับบริการพึงพอใจมากร้อยละ 88.89 นำเอานวัตกรรมไปทดลองใช้ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอื่นๆ และเป็นที่ยอมรับในประสิทธิผลเป็นอย่างดี

ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่าใบตองอ่อนมีความเหมาะสมกับแผลบางประเภท สามารถลดการบาดเจ็บ ลดค่าใช้จ่ายก็จริงแต่กระบวนการนำมาใช้จะต้องมีการเตรียมพื้นแผลอย่างเหมาะสม ขั้นตอนการเลือกวัสดุต้องมีความสะอาดปราศจากเชื้อโรค เพราะในใบตองจะมีเชื้อที่ก่อโรคอาจจะทำให้แผลเกิดการติดเชื้อลุกลามได้