

อาการข้างเคียงที่อาจพบได้

บริเวณที่ได้รับการรักษาด้วยสารไฮยาลูรอนิก แอซิด โดยปกติอาจพบการบวมแดง ปวด รู้สึกตึง เป็นจ้ำเขียว หรือมีอาการคัน ซึ่งอาการเหล่านี้จะหายไปเองภายใน 2-3 วันหลังจากฉีด หรือภายใน 1 สัปดาห์ กรณีที่ฉีดบริเวณริมฝีปาก ซึ่งถ้าอาการไม่ดีขึ้นควรปรึกษาแพทย์ผู้ฉีด

ข้อควรระวัง

- หากท่านรับประทานยาละลายลิ่มเลือด ควรแจ้งแพทย์ผู้ทำการรักษาก่อนทุกครั้ง
- หากท่านรับประทานวิตามินเสริมบางชนิดซึ่งอาจก่อให้เกิดการไหลของเลือดได้ง่ายขึ้นและอาจเกิดรอยช้ำ ดังนั้นควรงดวิตามินเสริมดังกล่าวก่อนได้รับการฉีดประมาณ 1 สัปดาห์
- ในคนไข้ที่มีประวัติของเริม อาจมีโอกาสไปกระตุ้นให้เกิดเริมขึ้นได้ แต่พบได้น้อยมาก
- หากหลังฉีดมีอาการปวดมากหรือสีผิวหนังเปลี่ยนแปลงมาก เช่น ชีดลง หรือคล้ำขึ้นผิดปกติควรติดต่อแจ้งแพทย์ผู้ทำการรักษาทันที

ข้อควรหลีกเลี่ยง

- ช่วง 2-3 วันแรกให้หลีกเลี่ยงการกดทับบริเวณที่ฉีด
- ภายใน 24 ชั่วโมงหลังการฉีดควรหลีกเลี่ยงการออกกำลังกายที่หักโหม และหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มน้ำแอลกอฮอล์
- ควรหลีกเลี่ยงการนวดหน้า ขัดหน้า หากต้องทำเลเซอร์ภายใน 2 สัปดาห์แรก หลังการฉีด ควรปรึกษาแพทย์ของท่านก่อนรับการรักษา

