



ขั้นตอนการผ่าตัดปลูกถ่ายเม็ดสี

1. แพทย์จะวัดขนาดของรอยโรคต่างขา และผิวหนังส่วนปกติที่จะนำไป
ผ่าตัดปลูกถ่ายโดยจะใช้ผิวหนังปกติบริเวณต้นขา ด้านหน้าหรือด้านหลัง
แพทย์จะทำความสะอาด ฉีดยาชาและผ่านชั้นหนังกำพร้าบริเวณผิวหนัง
ปกติ
2. ผิวหนังชั้นหนังกำพร้าที่ถูกตัดออกมาจะนำไปผ่านกระบวนการ
การแยกเอาเซลล์เม็ดสี และได้เป็นสารละลายที่มีเซลล์เม็ดสี อยู่หนาแน่น
โดยขั้นตอนนี้ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง
4. แพทย์จะนำสารละลายที่มีเซลล์เม็ดสีอยู่หนาแน่นมาปลูก
ถ่ายลงบริเวณรอยโรคต่างขาและปิดแผล ด้วยแผ่นคอลลาเจน ผ้าก๊อซ เทปปิดแผลจนครบ 7 วัน
(บริเวณใบหน้าปิดแผลนาน 4 วัน) โดยผู้ป่วยไม่ต้องเปิดแผลจนถึงวันที่มาพบแพทย์



การดูแลแผลหลังการผ่าตัด

1. ห้ามเปิดแผล ห้ามให้แผลโดนน้ำ งดกิจกรรมที่มีการเคลื่อนไหวมากจนถึงวันที่แพทย์นัด
2. หลังเปิดแผลแล้วสามารถโดนน้ำได้ งดใช้สบู่ ให้ใช้วาสลีนทาแผลและปิดแผลอีกประมาณ 14 วัน
3. หลีกเลี่ยงการขีดและขีดถูแรงๆ บริเวณแผลจนกว่าแผลจะหายสนิท
4. หากมีอาการปวดแผล สามารถรับประทานยาพาราเซตามอล ลดอาการปวดได้ทุก 4-6 ชั่วโมง
หลีกเลี่ยงการใช้ยาแอสไพริน

ผลข้างเคียง

1. สีผิวไม่สม่ำเสมอ
2. เกิดแผลเป็นนูน (พบได้น้อย)
3. แผลติดเชื้อ (พบได้น้อย)

ผลการรักษา

1. ผู้ป่วยจะเริ่มเห็นสีผิวบริเวณที่รักษากลับคืนมาเมื่อประมาณ 1 เดือนหลังการผ่าตัดและจะมีเม็ดสี
เพิ่มมากขึ้นชัดเจนใน ระยะเวลา 2-6 เดือน หลังจาก 6 เดือนแล้วยังสามารถพบเม็ดสีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
จนถึง 1-2 ปี
2. ในกรณีคนไข้มีขนหรือผมเป็นสีขาวในบริเวณที่ผ่าตัดหลังการรักษาด้วยการผ่าตัดปลูกถ่ายเม็ดสี
อาจทำให้ขนหรือผมบางส่วนมีสีกลับเป็นปกติได้